

La Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP)

**Journée des médecins de Santé Publique
20 septembre 2018**

La ROSP

→ Un peu d'histoire:

- Le P4P
- Le CAPI
- La ROSP

→ Les indicateurs ROSP 2011 – 2016

→ Les résultats

→ Les indicateurs ROSP 2016 – 2021

La ROSP: un peu d'histoire

→ Le P4P: « pay for performance »

- Concept anglo-saxon

→ Le CAPI: Contrat d'Amélioration des Pratiques Individuelles

- Mis en place en 2009 sur la base de la libre adhésion

→ La ROSP: née de la convention de 2011, signée par l'AM et les 4 principaux syndicats représentatifs des médecins (MG France, CSMF, SML, FMF)

Entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012

Se substitue au CAPI

→ Diversification des modes de rémunération , **fondée sur l'atteinte d'objectifs de santé publique**

Le principe: définition conventionnelle d'indicateurs. Le PS est rémunéré en fonction de son taux d'atteinte des différents indicateurs.

La ROSP

levier pour faire progresser la qualité des soins et la prévention

4 volets:

- prévention
- suivi des pathologies chroniques
- prescription de médicaments
- organisation du cabinet

Concerne initialement les Médecins traitant - cardiologues – gastro entérologues

Le volet organisation du cabinet concerne tous les médecins

La ROSP MT

23 indicateurs cliniques dont 19 calculés (et 4 déclaratifs)

→ Suivi des pathologies chroniques: (diabète – HTA)

- 8 indicateurs cliniques dont 4 déclaratifs

→ Prévention: (VAG – Dépistage Cancer – iatrogénie)

- 8 indicateurs

→ Prescription (efficience):

- 7 indicateurs

La ROSP spécialistes


- **ROSP cardiologues: 9 indicateurs cliniques (dont 2 déclaratifs)**
- **ROSP gastro entérologues: 8 indicateurs**

ROSP MT: Résultats

→ Bilan à 5 ans:

- le taux d'atteinte des objectifs a globalement progressé de 17,2 points
- Volet efficience: + 23 points
- Volet organisation du cabinet: + 23 points
- 15 des 19 indicateurs cliniques ont évolué favorablement
 - ✓ suivi des diabétiques: Hb A1C: + 9,2

LA ROSP: évolution du taux d'atteinte sur 5 ans



Volets	Taux d'atteinte 2012	Taux d'atteinte 2013	Taux d'atteinte 2014	Taux d'atteinte 2015	Taux d'atteinte 2016	Progression 2012/2016
Le suivi des maladies chroniques	50,3%	56,7%	58,9%	60,6%	60,8%	+ 10,5 points
La prévention	35,1%	40,4%	41,0%	42,1%	41,8%	+ 6,7 points
La prescription	56,0%	64,1%	69,9%	76,1%	79,3%	+ 23,3 points
L'organisation du cabinet	63,3%	76,3%	80,9%	83,3%	86,3%	+ 23,0 points

LA ROSP : résultats suivi des pathologies chroniques

Les résultats sur le volet « Suivi des pathologies chroniques » en synthèse

	Indicateurs	Objectifs cibles	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2016	Evolution en points déc. 2016 déc. 2011
HbA1c	Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages de l'hémoglobine glyquée dans l'année	>= 65 %	45,9%	55,1%	+ 9,2
Suivi ophtalmologique	Part des patients diabétiques ayant eu une consultation d'ophtalmologie ou un examen du fond d'œil dans les deux dernières années	>= 80 %	61,3%	62,7%	+ 1,3
Diabétiques à haut risque cardiovasculaire sous statines	Part des patients diabétiques (hommes de plus de 50 ans et femmes de plus de 60 ans) traités par antihypertenseurs qui ont bénéficié d'un traitement par statine	>= 75 %	58,3%	59,3%	+ 1,0
Diabétiques à haut risque cardiovasculaire sous statines et aspirine à faible dose	Part des patients diabétiques (hommes de plus de 50 ans et femmes de plus de 60 ans) traités par antihypertenseurs et statines qui ont bénéficié d'un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant	>= 65%	51,6%	60%	+ 8,4

La ROSP: résultats prévention

Les résultats sur la prévention du risque iatrogène
lié à la prescription d'antibiothérapie en synthèse
(Indicateurs à objectif décroissant)

	Indicateurs	Objectifs cibles	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2016	Évolution en points Déc 2016 - Déc 2011
Antibiothérapie	Nombre de prescriptions d'antibiotiques réalisées pour 100 patients âgés de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année	<= 37	45,7	38,6	-7,1
Benzodiazépines à demi-vie longue	Part des patients de plus de 65 ans traités par benzodiazépines à demi-vie longue dans l'année	<= 5%	13,7%	9,6%	-4,1
Durée de traitement par benzodiazépines	Part des patients ayant débuté un traitement par benzodiazépines et dont la durée de traitement est supérieure à 12 semaines	<= 12%	15,0%	14,3%	-0,7

La ROSP: résultat prévention suite

Les résultats sur les indicateurs de vaccination en synthèse

	Indicateurs	Objectifs cibles	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2016	Évolution en points déc. 2016 - déc. 2011
Grippe 65 ans et +	Part des patients 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière	>= 75%	57,8%	52,7%	-5,1
Grippe 16-64 ans en ALD	Part des patients de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne et vaccinés contre la grippe saisonnière	>= 75%	35,4%	33,7%	- 1,7

Les résultats sur les indicateurs de dépistage en synthèse (décembre 2011 - décembre 2016)

	Indicateurs	Objectifs cibles	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2016	Évolution en points Dec 2016 - Déc 2011
Cancer du sein	Part des patientes de 50 à 74 ans ayant bénéficié d'une mammographie dans les deux dernières années	>= 80 %	64,9%	62,3%	- 2,6
Cancer du col de l'utérus	Part des patientes de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années	>= 80 %	58,7%	55,9%	-2,8

LA ROSP: EVOLUTION

→ Convention 2016 – 2021: évolution de la ROSP:

- évolution de la ROSP MT
- Nouvelle ROSP: médecin traitant de l'enfant
- Nouvelle ROSP: endocrino

→ ROSP MT: évolution des indicateurs de prévention:

- ✓ 12 indicateurs (contre 8 en 2011)
- ✓ 5 axes prioritaires:
 - _ Vaccination
 - _ Dépistage des cancers
 - _ Iatrogénie
 - _ ATB
 - _ Conduites addictives

La nouvelle ROSP MT: indicateurs de prévention

Thème	indicateur	Objectif cible
Grippe	Part des patients MT âgés de 65 ans ou plus, vaccinés contre la grippe saisonnière	≥ 61%
	Part des patients MT âgés de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie chronique respiratoire (asthme, bronchite chronique, bronchectasie, hyperréactivité bronchique) ciblés par la campagne de vaccination et vaccinés	≥ 42%
Dépistage des cancers	Part des patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein	≥ 74%
	Part des patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années	≥ 65%
	Part des patients MT de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du cancer colo rectal a été réalisé au cours des 2 dernières années	≥ 55%

La nouvelle ROSP MT: indicateurs de prévention

thème	indicateur	Objectif cible
iatrogénie	Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour trouble psychiatrique (ALD 23) ayant au moins 2 psychotropes prescrits (hors anxiolytiques)	≤ 3 %
	Part de patients MT ayant initié un traitement par BZD hypnotique et dont la durée de traitement est > 4 semaines	≤ 30 %
	Part de patients MT ayant initié un traitement par BZD anxiolytique et dont la durée de traitement est > 12 semaines	≤ 9 %
ATB	Nombre de traitements ATB pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD	≤ 20 %
	Part des patients MT traités par ATB particulièrement générateurs d'antibiorésistances (amoxicilline + ac clav, C3G, C4G, FQ)	≤ 32 %
Conduites addictives	Part des patients MT tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier	≥ 75%
	Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier	≥ 75%

ROSP MT de l'enfant (<16 ans)

thème	Sous thème	indicateur	Objectif cible
Suivi des pathologies chroniques	asthme	Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme traités par corticoïdes inhalés et/ou antileucotriènes	≥ 70%
		Part de patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle	≥ 60%
prévention	obésité	Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois /an	≥ 95% (D)
	vaccination	Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu 2 doses de ROR	≥ 80%
		Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C	≥ 83%

ROSP MT de l'enfant (<16 ans)

thème	Sous thème	indicateur	Objectif cible
prévention	ATB résistance	Part des patients MT de moins de 4 ans traités par C3G ou C4G parmi les patients de moins de 4 ans traités par ATB	≤11%
		Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par C3G ou C4G parmi les patients de moins de 4 ans traités par ATB	≤ 7%
	Dépistage des troubles sensoriels	Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs	≥ 95% (D)
	Dépistage des troubles de l'apprentissage	Part des patients MT de 3 à 5 ans qui ont eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autres)	≥ 95% (D)
	Suivi bucco-dentaire	Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT'dent ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire	≥ 83%

→ Au total:

- Les indicateurs
 - ✓ Élaborés conjointement par les parties signataires (AM/Syndicats de médecins)
 - ✓ En fonction de l'importance du problème sanitaire couvert
 - ✓ En s'appuyant sur les avis des autorités de santé (HAS – ANSM – INCa – SPF)
 - ✓ Mais aussi sur les recommandations internationales
 - ✓ Et sur les propositions du CMG
- Diversification des modes de rémunération:
 - ✓ En moyenne, 6993 € versés aux MG en 2016
- Levier de santé publique